



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CABINET SECRETAR DE STAT

8853
7 12 2009

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SECRETAR DE STAT
Nr. SC 425
Ziua 07 Luna 12 Anu 2009

**CATRE
DIRECTIILE DE SANATATE PUBLICA JUDETENE SI A MUNICIPIULUI
BUCURESTI**

**In atentia Doamnei/Domnului director coordonator
Doamnei/Domnului director coordonator adj. Sanatate publica si
programe**

Avand in vedere ca in contextul evolutiei pandemiei de gripa A/H1N1 la nivel national dar si international femeile gravide reprezinta una din grupele cele mai expuse la imbolnavire si dezvoltarea de forme severe de boala, va transmitem in anexa atasata procedura pentru managementul cazurilor de gripa A/H1N1 pentru aceasta categorie de risc.

Va rugam sa transmiteti tuturor unitatilor sanitare publice si private aceasta procedura, in vederea asigurarii asistentei medicale corecte in cazul aparitiei de cazuri de imbolnavire in randul femeilor gravide.

In ceea ce priveste vaccinarea gravidelor cu vaccinul gripal cu tulpina pandemica, vaccinarea gravidei se poate realiza cu produsul Cantgrip, in trim II sau III de sarcina, la recomandarea formulata de catre medicul obstetrician care are in urmarire sarcina sau medicul de familie care are in ingrijire gravida (pe listele de pacient).

Vaccinarea se efectueaza la cabinetul Medicului de Familie cu inregistrarea si notificarea catre DSP judetean a vaccinarii efectuate, precum si a eventualelor RAPI (conform metodologiei transmise).

Totodata, va solicitam sa informati toate unitatile sanitare de pe teritoriul de competenta ca este interzisa utilizarea testelor rapide pentru stabilirea diagnosticului etiologic al gripei, atat pentru cazurile suspecte de gripa sezoniera dar mai ales pentru gripa A/H1N1.

Cu stima

SECRETAR DE STAT

PROF. DR. ADRIAN STREINU-CERCEL



CC: CPCBT - ISP Buc

1. GRAVIDA SIMPTOMATICA

Contact caz confirmat:

Nu se recolteaza RT-PCR,
Se confirma clinic si epidemiologic (Fisa Unica)
Se trateaza cu Tamiflu: 2 cp/zi x 7 zile sau cu
Zanamivir: 2 pufuri x2/zi, 7 zile (de preferat)

Contact caz compatibil, neconfirmat etiologic

Se recolteaza RT-PCR

Se initiaza tratament cu Tamiflu sau Zanamivir pentru 72 ore

Rezultat

negativ:

Se intrerupe tratamentul

pozitiv:

Se continua tratamentul 7 zile, Fisa Unica,
izolare la domiciliu (daca nu e forma severa),
sub supraveghere medicala

2. GRAVIDA ASIMPTOMATICA

CONTACT CU CAZ SIMPTOMATIC, CONFIRMAT SAU NU

Profilaxie cu

Zanamivir 2 pufuri x 2/zi, timp de 7 zile

sau

Tamiflu: 2 cp/zi x 7 zile

(de preferat o singura cura profilactica in cursul sarcinii)

3. MAMA SIMPTOMATICA IN PRIMELE 6 SAPTAMANI POST-PARTUM (atentie mai ales in primele 2 saptamani)

Contact caz confirmat:

Nu se recolteaza RT-PCR,
Se confirma clinic si epidemiologic (Fisa Unica)
Se initiaza tratament cu Tamiflu sau Zanamivir
Izolare copil si protectie respiratorie
Poate alapta copilul la san

Contact caz compatibil, neconfirmat etiologic

Se recolteaza exudat pentru RT-PCR

Se initiaza tratament cu Tamiflu sau Zanamivir pentru 72 ore

Izolare copil si protectie respiratorie

Poate alapta copilul

Se asteapta rezultatul RT-PCR:

Negativ:

Se intrerupe tratamentul

Pozitiv:

Se continua tratamentul pana la 7 zile, Fisa Unica,
izolare la domiciliu (daca nu e forma severa),
sub supraveghere medicala