

Strategia Globală pentru eliminarea cancerului de col uterin

lansată în 17 noiembrie 2020 de
Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
printr-o rezoluție adoptată de 194 de țări.

Obiectiv: până în anul 2030 incidența cancerului de col uterin să scadă și să se mențină la
sub 4 cazuri noi la 100.000 de femei.

Atingerea obiectivului ar fi posibilă dacă sunt
îndeplinite 3 ținte esențiale:

▪ 90% din fetițe să fie vaccinate împotriva HPV până la împlinirea vârstei de 15 ani




▪ 70% din femeile adulte să fie testate cu un test de înaltă performanță de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani



▪ 90% din femeile cu teste pozitive să beneficieze de tratament al leziunilor pre-canceroase și al celor maligne



România are cea mai ridicată incidență și mortalitate prin cancer de col uterin în Uniunea Europeană (2020)



Incidența și mortalitatea prin cancer de col uterin în țările UE, 2022, ASR/1000 femei (raportat la populația standard europeană 2013)
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/factsheets/cervical_cancer_en-Nov_2021.pdf

Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a adoptat Strategia globală de accelerare a eliminării cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică până în 2030.

CEI 3 PILONI AI STRATEGIEI OMS

- 1 Prevenirea prin vaccinare**
Vaccinarea HPV asigură protecția pe termen lung împotriva cancerului cervical.
- 2 Screening și tratament al leziunilor pre-canceroase**
Pot preveni dezvoltarea leziunilor pre-canceroase în cancer.
- 3 Tratamentul precoce pentru cancerul cervical invaziv**
Poate salva vieți!

*Pentru a elimina cancerul cervical, toate țările trebuie să atingă și să mențină o incidență sub 4 cazuri per 100 000 femei.

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită

IANUARIE 2024

CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Informează-te!
Testează-te!
Vaccinează-te!



Material adresat populației generale




MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică

CE ESTE cancerul de col uterin (cancerul cervical)?



Cancerul care apare în celulele colului uterin (partea inferioară a uterului care se conectează la vagin) din cauza înmulțirii necontrolate, haotice a unor celule anormale, cel mai frecvent în prezența HPV.

CINE ESTE LA RISC de a dezvolta cancer cervical?

- Toate femeile care și-au început viața sexuală, sunt la risc de a dezvolta cancer cervical.
- Cel mai frecvent femei în vârstă de 35-44 ani

CE SIMPTOME ARE cancerul de col uterin?

- În mod obișnuit nu există simptome în stadiile precoce.
- Când apar, simptomele pot include:
 - ❖ Sângerări vaginale anormale
 - ❖ Scurgeri vaginale anormale
 - ❖ Durere la contactul sexual
- Aceste simptome apar și în alte afecțiuni, fără a semnifica neapărat un cancer de col uterin.
- În cazul în care apar, adresați-vă imediat medicului!

CARE ESTE CAUZA cancerului de col uterin?

- Peste 90% din cazuri sunt cauzate de infecția cu HPV
- HPV se transmite în special prin contact sexual
- 8 persoane din 10 se infectează cu HPV în cursul vieții
- În majoritatea cazurilor infecția se va vindeca de la sine, și nu vor dezvolta niciodată cancer cervical.
- Uneori, infecția HPV persistentă și poate produce leziuni, veruci (condiloame) genitale sau leziuni precanceroase.
- Tipurile de HPV care produc veruci sunt diferite de tipurile de HPV care pot produce cancer.
- Între infecția cu HPV și apariția cancerului de col uterin pot trece mulți ani (chiar zeci).
- Infecția cu HPV nu prezintă simptome

CANCERUL DE COL UTERIN POATE FI PREVENIT?
Da, cancerul de col uterin poate fi prevenit prin
vaccinare anti HPV și screening!



Vaccinarea și screening-ul pot salva vieți!

Infecția HPV poate cauza și dezvoltarea cancerelor de:

- organe genitale (vagin, vulva sau penis), anus
- orofaringeale (cancere ale gurii, ale corzilor vocale)

INFECȚIA CU HPV poate fi tratată?

- Nu există tratament pentru infecția cu HPV,
- Pot fi tratate efectele produse de infecția HPV.

HPV nu înseamnă HIV

- Virusul Papilloma Uman (HPV) și Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) sunt viruși foarte diferiți
- HPV și HIV provoacă probleme de sănătate diferite.

VACCINAREA anti – HPV

pentru prevenirea cancerului de col uterin

- Vaccinul antiHPV oferă protecție împotriva formelor invazive de cancer cauzate de HPV.
- Riscul de infecție este la fel de mare în cazul fetelor și al băieților.
- Momentul optim pentru vaccinare înaintea debutului activității sexuale (înaintea apariției riscului de infecție HPV)

În România, vaccinarea anti HPV:

- ❖ Este gratuită pentru fete și băieți între 11 ani și 19 ani
- ❖ Este compensată 50% pentru femei între 19 ani și 45 ani

SCREENING-UL

pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin

- Screeningul reprezintă testarea periodică, la intervale regulate, a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (25 – 64 ani) pentru a depista dacă au leziuni precanceroase;
- Dacă apar leziuni precanceroase, pot fi tratate și nu vor mai evolua către cancer, prevenind astfel apariția cancerului de col uterin!

RECOMANDĂRI SCREENING

- Femei între 25-29 ani: testul Babeș Papanicolaou
- Femei între 30- 64 ani: testul HPV
- Test efectuat o dată la fiecare 5 ani

**Dacă aveți între 25 și 64 de ani adresați-vă
programelor de screening organizat populațional al
cancerului de col uterin pentru un test gratuit!**

**Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare și screening
și poate fi vindecat dacă este depistat la timp și tratat corespunzător!**